

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

選擇題：

1. (1) ①髮條②小髮髻③半頂髮笠④髮片 可以折成曲狀或圓型來修飾頭髮用。
2. (1) 完成指推波紋後，過長烘乾的時間將會①造成頭髮的乾燥②破壞波紋③增加頭髮及頭皮的油脂④使波紋較持久。
3. (3) 顧客有怨言時宜①陪顧客一起抱怨②不理不睬③當聆聽者④對顧客歡心火上加油。
4. (4) 染髮前除了要檢查髮質外還要觀察①頭髮粗細②頭髮是否自然捲③頭髮長度④頭皮是否損傷。
5. (1) 流行性感冒是由何種病原體所引起的①病毒②黴菌③細菌④原生蟲。
6. (1) 急救箱內應備有①優碘②白花油③氨水④紅藥水 來消毒傷口。
7. (4) 向右斜長的瀏海，頭髮應拉往①右前方②左側方③右側方④左前方 修剪。
8. (4) 瓦斯熱水器裝在室外以防發生①四氯化碳②二氧化碳③二硫化碳④一氧化碳 中毒。
9. (1) 皮膚最容易吸收養分的時段為①夜間②中午③上午④下午。
10. (1) 渦線的髮流是屬於①自由曲線②三角曲線③立體曲線④幾何曲線。
11. (4) 頭髮內的間充物質流失，易使頭髮造成①中性②油性③撥水性④多孔性。
12. (1) 毛髮的水分，大都存留在毛髮的①間充物質②表皮層③髓質層④角質纖維。
13. (4) 一般頭髮的平均壽命約為①二～三個月②六個月～一年③七～八年④二～六年。
14. (4) 理燙髮業從業人員健康檢查①每季②每半年③每月④每年 檢查乙次。
15. (1) 美髮師服務顧客的主要責任不包括①提供顧客心理及生理的治療②使顧客舒適③防範顧客受傷④提供顧客適當，且專業性的服務。
16. (1) 具有清新、自然感的髮飾為①鮮花②緞帶③帽子④珍珠。
17. (3) 蛋殼形指甲可能是全身的慢性疾病或①肌肉組織疾病②循環系統疾病③神經系統疾病④呼吸系統疾病 所引起。
18. (4) 黑色素細胞是以下列何種胺基酸作為原料①麩胺酸②胱胺酸③離胺酸④酪胺酸。
19. (1) 陽性肥皂液屬於陽離子界面活性劑之一種，其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉為蛋白質會被①溶解作用②凝固作用③氧化作用④變質作用。
20. (3) 細菌之基本構造，在菌體最外層為①細胞膜②細胞核③細胞壁④細胞質。
21. (4) 等長剪法最容易有缺失的是①側中線②中心線③臉際線④頸側線。
22. (2) 無刺激性、有安撫鎮靜作用的保養品較適用於①中性②敏感性③油性④乾性 皮膚。
23. (4) 漂淡頭髮，宜先漂①髮根②髮幹③髮尾④髮中。
24. (3) 下列何者是由於角質層細胞過度脫落累積在頭皮上所引起的①疥癬②皮脂瘤③頭皮屑④禿頭症。
25. (3) 營業場所從業人員如發現顧客有皮膚病之傳染病①先洗淨其受感染的皮膚再行服務②事後始發現，雙手及器具洗淨即可③應拒絕提供服務④仍可為其服務。
26. (1) 臉大而扁的圓形臉髮型設計應加高①頭頂②瀏海③鬢角④兩側 部分達到修正臉型的效果。
27. (4) S 線的髮型設計表現①嫵媚②浪漫③帥氣④典雅。
28. (4) 口角炎係因缺乏維生素①C②A③D④B 所致。
29. (1) 測量頭圍，應從前額中央髮際開始，繞過耳上及①後部點②頂部點③黃金點④頸部點 再回原點。

30. (3) 剪髮時由後往前的漸增長度，可使髮型外輪廓線呈①圓形②V字形③倒V形④水平線。
31. (4) 預防流行性感冒，下列何者無關①工作場所保持空氣清新②工作人員戴口罩③接種疫苗④撲滅病媒。
32. (4) 使用電鉗時，電鉗夾髮處離頭皮至少要有①4公分②6公分③8公分④2.5公分。
33. (1) 砂眼和結膜炎的預防方法，下列敘述何者錯誤①按規定接受預防接種②公用毛巾要洗淨並經有效消毒③洗臉盆要經常清洗乾淨④不要共用毛巾或手帕。
34. (3) 影響病原體生長的條件，下列何者是錯誤①溫、濕度②氧氣、光線③蛋白質、脂肪④酸鹼度、滲透壓。
35. (1) 在做指推波紋前應先找出①毛流②捲髮的痕跡③髮緣線④客人資料。
36. (1) 屋內充滿濃煙時，可用濕毛巾將口鼻掩住後以①低②一般③任何④高 姿勢逃生。
37. (2) 金色髮的色素粒子中，其黃色粒子佔①60%②80%③20%④40%。
38. (3) 化粧品中加香料會引起過敏性皮膚炎，係因部分香料含①乙醇②苯③光敏感劑④乙酸 所致。
39. (4) 設髮長為10公分、捲棒直徑為1公分，則上捲後的圈數約有①四圈②二圈③五圈④三圈。
40. (4) 冷燙第一劑的功能是切斷頭髮的二硫化鍵，使其膨脹、軟化而失去彈性，稱為①生化作用②氧化作用③物理作用④還原作用。
41. (3) 成型波紋的紋峰高低，決定於髮片所提的①髮量②寬度③角度④髮長。
42. (3) 推剪時剪刀與梳子宜成①45°②60°③0°④90°。
43. (3) 取橫髮片用削刀打薄右邊邊緣時，髮稍會偏向①向下垂落②中間③右邊④左邊。
44. (3) ①挑燙②扇形燙③粽子燙④雨傘燙 可控制髮根不鬚曲的距離。
45. (2) 在營業場所的地板，門把等應以何方法來做消毒處理①紫外線消毒②化學消毒③煮沸消毒④蒸氣消毒。
46. (3) 物理消毒法係指運用物理學的原理達到消毒目的，以下何者為非①輻射線②超音波③化學變化④光與熱。
47. (2) 為使頭髮較易成型且不易在頭頂上造成彎曲或分開，梳髮及分髮時應①視髮型需要梳理②依毛流生長的方向梳理③增加髮膠的用量④逆毛流梳理。
48. (2) 燙髮時鬚度的波紋大小決定於①藥劑的強弱②捲棒的大小③角度的高低④時間的長短。
49. (4) 脫髮症患者防止惡化的方法應①自行塗抹藥物②自行服用中藥③以80℃的溫水按摩④求助於皮膚科醫師。
50. (1) 對於來源不明之化粧品之處理，何者錯誤①當作促銷品，送給老顧客②不得販賣、供應③不得意圖販賣、供應而陳列④拒絕進貨。
51. (2) 下列何者對於染髮劑的存放是正確的①年度用量應一次進庫，以保品質穩定②置乾燥陰涼處所③任意放置無所謂④全部展示在櫥窗中，供顧客選用及方便拿取。
52. (1) 使用輕、柔軟、可任意彎曲燙髮用具的是①萬能燙②車輪燙③螺絲燙④拐子燙。
53. (2) 依傳染病防治條例，營業場所負責人發現顧客有疑似傳染病應於何時報告衛生單位①一週內②24小時內③勿須報告④48小時內。
54. (1) 選購髮笠時，以適合於使用者的①頭寸②髮質③髮色④鬚曲度 為第一要件。
55. (3) 漂髮由黑髮到白髮的顏色變化過程中第七步驟的顏色變化為①黑色②褐(棕)色③黃白色④黃色。
56. (2) 髮型不易乾或不易梳理的主要原因是①剪髮精密②髮量過多③頭髮太細④頭髮太軟。
57. (4) 握手時要由①平輩②男士③晚輩④長輩 先伸手。
58. (4) 不是預防傳染病的方法是①預防接種使身體增強抵抗力②改善環境衛生③消毒、隔離④濫服抗生素。
59. (2) 香菇髮型髮量的重點在①中心線②水平線③後頸線④側中線。
60. (4) 在平面上左右有大小兩點，在視覺上會由右邊移向左邊，則兩點為①一樣小②一樣大③左邊

大右邊小④右邊大左邊小。

61. (2) 保持頭皮健康的基本要素就是①整髮②清潔③按摩④梳刷。
62. (1) 染髮時，所取髮束厚度約為①1 公分②3 公分③4 公分④2 公分。
63. (1) 下列何者傳染病非經蚊蟲叮咬傳染①愛滋病②日本腦炎③瘧疾④登革熱。
64. (1) 對於頭蝨之描述，何者錯誤①隨著衛生環境改善，頭蝨感染已經在台灣消失②使用感染頭蝨者用過的梳子、毛巾、頭巾、髮帶、衣物、戴過的帽子、睡過的床鋪、枕頭等，有可能被傳染③頭蝨是一種棕灰色，6 隻腳，沒有翅膀，類似芝麻大小的昆蟲④頭蝨是一種體外寄生蟲，生活在擁擠且衛生條件較差的環境下。
65. (2) 美容院必須備有完整的①工具箱②急救箱③小費箱④意見箱 以便發生意外時隨時可運用。
66. (3) 毛髮開始生長於人體的時期，可溯至胎兒①一個月②七個月③三個月④五個月。
67. (1) 兩側髮流往後時，持髮角度宜①往前②往下③往上④往後 拉剪。
68. (1) 五代時（紅妝）盛行（以）高髮，梳成①朝天髻②靈蛇髻③隨馬髻④飛天髻。
69. (1) 為了防止指甲四周的皮膚乾燥，可使用①表皮膏②酒精③防腐劑④祛光劑。
70. (1) 夾捲的三個主要結構是：底盤、圓環及①髮幹②髮束③髮孔④支軸。
71. (4) 下列何項設備不是營業場所必備的①滅火器②急救箱③有蓋垃圾桶④煙灰缸。
72. (3) 保養敏感性皮膚宜①多蒸臉②多按摩③以無酒精成分的化粧水輕輕拍打④常用拍打式的按摩。
73. (2) 頭髮的組成胺基酸中，最重要的是①精胺酸②胱胺酸③絲胺酸④甘胺酸。
74. (1) ①單乙醇胺②雙氧水③溴酸鉀④溴酸鈉 不可做為冷燙第二劑的主劑。
75. (1) 髮簪(步搖)流行於①唐朝②元朝③明朝④宋朝。
76. (2) ①年齡②血液③健康狀況④營養的攝取 並不影響指甲生長速度。
77. (4) 不能藉定期驗血，及早發現，防止散播的傳染病為①後天免疫缺乏症候群（愛滋病）②梅毒③B 型肝炎④肺結核。
78. (3) 髮型設計向心運動給人①不安全感②柔弱感③含蓄感④開放寬闊感。
79. (3) 燙易捲的頭髮適合用①塗藥捲法②護髮捲法③水捲法④先塗藥捲法。
80. (4) 與理燙髮業建立證照制度無直接關係的是①落實理燙髮業的稽查管理②訂定營業衛生管理法③參加男子理髮或女子美髮技術士技能檢定④參加高普考。